



PROTOCOLE EN CAS DE SURDOSE AUX OPIOÏDES FLOWCHART

SI LA PERSONNE NE RÉAGIT PAS APRÈS 3 MINUTES, DONNEZ UNE DEUXIÈME DOSE DE NALOXONE À LA VICTIME.

SI VOUS AVEZ UTILISÉ DE LA NALOXONE PAR VOIE INTRANASALE, DONNEZ LA SECONDE DOSE DANS L'AUTRE NARINE.

SI VOUS AVEZ UTILISÉ LA NALOXONE EN INJECTION, UTILISEZ UN NOUVEAU CONTENANT POUR LA SECONDE DOSE.

UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES PEUT ÊTRE SUSPECTÉE LORSQU'IL Y A UNE POSSIBILITÉ DE CONSOMMATION DE DROGUES OU DE MÉDICAMENTS.

LES SIGNES ET SYMPTÔMES D'UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES SONT:

- VICTIME INCONSCIENTE
- RESPIRATION DIFFICILE, RONFLANTE OU ABSENTE
- PUPILLES EN POINTE D'AIGUILLE
- LÈVRES ET ONGLES BLEUS
- PEAU FROIDE ET MOITE

EN CAS D'ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE, ADMINISTRER LA NALOXONE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

ADMINISTRER DE LA NALOXONE SI LA VICTIME DÉMONTRE DES SIGNES MARQUÉS DE DÉGRADATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE OU DE LA RESPIRATION.

LA NALOXONE EST UN MÉDICAMENT POUVANT ÊTRE ADMINISTRÉ PAR VOIE INTRANASALE AINSI QUE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE. ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT LORS DE SON ADMINISTRATION OU DE DOSES MULTIPLES (TEMPS ET DOSE).

LA NALOXONE N'A AUCUN EFFET SECONDAIRE.

PROTOCOLE EN CAS DE SURDOSE AUX OPIOÏDES

NIVEAU DE CONSCIENCE

